

NON-DELIVRANCE CHEZ LA VACHE

Définition - enjeu

La rétention de tout ou partie du placenta au-delà de 24 heures après le vêlage aboutit généralement à un retard d'involution utérine et au développement d'une métrite, préjudiciables au démarrage de la lactation et surtout au délai et à la réussite de la future mise à la reproduction.

Causes

La non-délivrance sanctionne fréquemment les vêlages avant terme : avortements (ne pas oublier de les déclarer, c'est obligatoire), mise-bas prématurée (spontanée ou déclenchée), et les naissances de jumeaux (au moins l'une des enveloppes n'est pas expulsée) Elle peut aussi suivre les vêlages laborieux, ou être l'un des premiers signes de fièvre de lait (conséquence : une vache à terme qui n'a pas bien délivré sera à surveiller de près lors de ses prochains vêlages).

Des prédispositions d'origine alimentaire peuvent exister : déficit en calcium, magnésium ou oligo-éléments (sélénium) .

Traitement

Face à une rétention placentaire, il existe deux types d'action :

1. intervention locale :

Elle doit **IMPERATIVEMENT** être menée dans les meilleures conditions d'hygiène, sinon elle perd tout son intérêt : vulve de la vache nettoyée et séchée, mains et bras de l'intervenant lavés, revêtus de gants à usage unique, port d'une blouse plastique propre.

Ce n'est pas tout de le faire, il faut **BIEN** le faire. Donc de préférence par votre vétérinaire. Pourquoi ? La réponse est simple : afin d'éviter des problèmes de péritonites, de caillettes et surtout de métrites, d'infécondités et donc d'infertilités, qui au final coûteront bien plus cher qu'une simple visite. A cela se rajoute un allongement de l'intervalle Vêlage en plus d'une diminution de la production laitière.

L'introduction d'oblets gynécologiques antibiotiques doit aussi se faire dans de parfaites conditions de propreté. Leur mauvais usage peut générer des résistances de la part de germes qui se trouvent ainsi sélectionnés.

2. intervention par injections :

Elle évite des risques supplémentaires de contamination des voies génitales.

Juste après vêlage et dans les jours qui suivent, on dispose entre autre de deux spécialités qui vont aider le placenta à se détacher : l'une est utilisée surtout en élevage porcin, l'autre, homéopathique est d'efficacité reconnue même en pratique non bio.

L'utilisation de prostaglandines naturelles stimule la vidange de l'utérus et son involution. Son intérêt est indiscutablement reconnu. Du fait de ses effets secondaires, elle doit cependant être pratiquée avec précautions dans certaines circonstances (en discuter avec votre vétérinaire).

Enfin, dans certains cas, un traitement antibiotique injectable de couverture peut s'avérer nécessaire.

Dernier point, n'oubliez pas de prendre régulièrement la TEMPERATURE.

Conclusion

La non-délivrance peut avoir des conséquences économiques lourdes : baisse de production, risque accru de déplacement de la caillette, infécondité ultérieure, qui méritent qu'on la considère comme une pathologie à ne pas négliger. La répétition du nombre de cas dans votre élevage doit faire suspecter un problème sous-jacent, qu'il est important d'aborder avec votre vétérinaire, votre interlocuteur ayant la meilleure vue d'ensemble sur ces sujets.